

tacholiquin roztwór 1% jest roztworem jałowym, przejrzystym, bezbarwnym, bezsmakowym i bezwonny.

1 ml zawiera 0,01 g tyloksapolu, 0,05 g glicerolu oraz wodorowęglan sodu w roztworze wodnym, tacholiquin roztwór 1% jest wyrobem medycznym klasy IIa.

tacholiquin roztwór 1% stosuje się w leczeniu uzupełniającym różnych chorób dróg oddechowych lub płuc z występowaniem lepkiej plwociny.

- W ostrych i przewlekłych podrażnieniach lub zapaleniach dróg oddechowych, takich jak:
 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 - Zapalenie zatok (sinusitis)
 - Zapalenie tchawicy (tracheitis)
 - Zapalenie oskrzeli i oskrzelików (bronchitis i bronchiolitis)
 - Astma oskrzelowa (przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych połączona z napadową dusznością)
 - Pseudokrup (wirusowe zapalenie krtani połączone z kaszlem i dusznością)
 - Zapalenie płuc
 - Roztrzenie oskrzeli (bronchiectasis)
 - Wrodzona i nabyta niedodma (niewentylowane obszary płuc z powodu zapadniętych odcinków płuc)
- Pod nadzorem lekarza: Zapobieganie zastojom wydzieliny i usuwanie ich w przypadku mechanicznego upośledzenia oddychania
 - po operacjach
 - po nacięciu tchawicy (tracheotomia)
- Pobudzanie odkrztuszania wydzieliny zakaźnej
- Ułatwianie i wspomaganie zabiegów diagnostycznych, na przykład do wykrywania bakterii, komórek patologicznych itp.
- Wspomaganie antybiotykoterapii miejscowej

- Jeśli znana jest nadwrażliwość na któryś ze składników preparatu
- W obrzęku płuc i gromadzeniu się płynu w płucach
- U niemowląt poniżej 3 miesięcy lub poniżej 6,5 kg masy ciała.

Ponadto w przypadku wcześniaków należy wykluczyć utrzymujący się zespół zaburzeń oddychania noworodka (IRDS).

- U dzieci poniżej 3 lat zaleca się stosowanie roztworu tacholiquin w stężeniu 0,1%. Roztwór tacholiquin 1% należy rozcieńczyć jałowym roztworem izotonicznym soli fizjologicznej z apteki.
- Należy zachować szczególną ostrożność, stosując tacholiquin roztwór 1%, jeśli usunięcie śluzu z dróg oddechowych jest poważnie utrudnione, w wyniku czego powstaje zastój wydzieliny (np. zaburzenia czynności rzęsek, zespół nieruchomych rzęsek).
- Aby uniknąć hiperwentylacji, należy unikać wymuszonego oddychania, szczególnie w przypadku stosowania zamkniętych masek na twarz.
- tacholiquin roztwór 1% nie nadaje się do wstrzykiwania.
- Nie do ponownego użycia!

tacholiquin roztwór 1% może być stosowany zarówno jako środek wziewny, jak i do zakraplania.

Do inhalacji konieczna jest nebulizacja za pomocą urządzenia do wytwarzania aerozolu - wymóg ten spełniają dostępne na rynku inhalatory, w szczególności membranowe, kompresorowe i ultradźwiękowe. Nieodpowiednie są tak zwane inhalatory parowe z gorącą wodą. Aby zastosować lek w inhalatorze otwórz zamknięcie buteleczki, odkręcając zakrętkę. Wlej nierozcieńczony roztwór do pojemnika inhalatora. Jeśli roztwór ma zostać rozcieńczony, należy go rozcieńczyć bezpośrednio w pojemniku inhalatora.

Do jednej aplikacji należy użyć maksymalnie 5 ml roztworu tacholiquin 1% (co odpowiada jednej dawce).

Zastosowane urządzenie do inhalacji należy czyścić według wskazówek producenta.

Zakraplanie może być przeprowadzane tylko w porozumieniu z lekarzem i przez przeszkolony personel.

W celu zakroplenia tacholiquin roztwór 1% rozcieńcza się jałową izotoniczną solą fizjologiczną z apteki, jak opisano poniżej i nanosi bezpośrednio na błonę śluzową za pomocą pipety lub strzykawki, na przykład bronchoskopowo przed odsysaniem śluzu.

Maksymalna dzienna dawka wynosi 15 ml, czas trwania leczenia zależy od indywidualnych objawów i jest ustalany przez lekarza.

tacholiquin roztwór 1% należy stosować według poniższych wskazówek.

Maksymalny czas leczenia jest ustalany w porozumieniu z lekarzem i zależy od indywidualnych objawów.

C

Inhalacja

- Inhalacja krótkotrwała - Wdychać kilka razy dziennie, zwykle 3 do 5 razy, maksymalnie 5 ml preparatu tacholiquin roztwór 1%. W zależności od zastosowanego inhalatora czas inhalacji wynosi około 5-15 minut. Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych objawów oraz postępu terapii i jest ustalany przez lekarza.

- Długotrwała inhalacja ciągła - W ciężkich przypadkach i gdy istnieje ryzyko niewydolności oddechowej, zalecana się długotrwałą inhalację ciągłą preparatu tacholiquin roztwór 1% przy użyciu odpowiednich urządzeń. Czas aplikacji wynosi maksymalnie 1 godzinę. Dziennie można stosować do inhalacji maksymalnie 25 ml preparatu tacholiquin roztwór 1%.

Inhalację ciągłą można przeprowadzać tylko w porozumieniu z lekarzem.

Zakrapianie

Zakrapianie może być przeprowadzane tylko w porozumieniu z lekarzem i przez przeszkolony personel.

Do zakrapiania tacholiquin roztwór 1% rozcieńcza się w stosunku 1: 1 (= roztwór 0,5%). Do rozcieńczenia należy użyć jałowego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej z apteki.

- Bezpośrednie nanoszenie miejscowo na błonę śluzową można w zależności od potrzeby wykonać raz lub wielokrotnie, jest ono szczególnie zalecane w ostrych stanach utrudnionego oddychania wskutek powstałych zatorów wydzieliny.
- U pacjentów po tracheotomii usuwanie zaschniętej wydzieliny można ułatwić przez codzienne podawanie rozcieńczonego preparatu tacholiquin roztwór 1% przez rurkę tracheotomijną.

Dziennie można zakraplać maksymalnie 15 ml preparatu tacholiquin roztwór 1%.

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych objawów oraz postępu terapii i jest ustalany przez lekarza.

U niemowląt od 3 miesięcy i o masie ciała od 6,5 kg oraz u dzieci do 3 lat należy stosować do inhalacji krótkotrwałych i długotrwałych wyłącznie roztwór tacholiquin 0,1%.

Do rozcieńczenia preparatu tacholiquin roztwór 1% w stosunku 1:10 (= roztwór 0,1%) należy używać jałowego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej z apteki.

Inhalacja

- Inhalacja krótkotrwała - Wdychać kilka razy dziennie, zwykle 3 do 5 razy, maksymalnie 5 ml roztworu tacholiquin 0,1%. W zależności od zastosowanego inhalatora czas inhalacji wynosi około 5-15 minut. Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych objawów oraz postępu terapii i jest ustalany przez lekarza.
- Długotrwała inhalacja ciągła - W ciężkich przypadkach i gdy istnieje ryzyko niewydolności oddechowej, zaleca się ciągłe wdychanie roztworu tacholiquin 0,1% za pomocą odpowiednich urządzeń.

Czas aplikacji wynosi maksymalnie 1 godzinę. Dziennie można stosować do inhalacji maksymalnie 25 ml preparatu tacholiquin roztwór 0,1 %.

Inhalację ciągłą można przeprowadzać tylko w porozumieniu z lekarzem.

Zakrapianie

Zakrapianie może być przeprowadzane tylko w porozumieniu z lekarzem i przez przeszkolony personel. Do zakrapiania używać roztworu tacholiquin 0,1%.

- Bezpośrednie nanoszenie miejscowo na błonę śluzową można w zależności od potrzeby wykonać raz lub wielokrotnie, jest ono szczególnie zalecane w ostrych stanach utrudnionego oddychania wskutek powstałych zatorów wydzieliny.
- U pacjentów po tracheotomii usuwanie zaschniętej wydzieliny można ułatwić przez codzienne kilkakrotne podawanie roztworu tacholiquin 0,1% przez rurkę tracheotomijną.

Dziennie można zakraplać maksymalnie 15 ml roztworu tacholiquin 0,1%.

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych objawów oraz postępu terapii i jest ustalany przez lekarza.

Brak doświadczeń w stosowaniu preparatu tacholiquin roztwór 1% podczas ciąży i karmienia piersią.

Czasami po pierwszych głębokich oddechach może wystąpić na początku kaszel lub duszność, które ustępują samoistnie po zwilżeniu błony śluzowej. Reakcje nadwrażliwości są bardzo rzadkie, ale u osób wrażliwych może wystąpić duszność w wyniku skurczu oskrzeli, kaszel i nudności.

Niepożądane interakcje z innymi wyrobami medycznymi i lekami nie są znane. W literaturze nie ma doniesień na ten temat.

tacholiquin roztwór 1% powoduje rozpuszczanie i ułatwia usuwanie lepkich mas śluzowych i zatorów wydzieliny z błon śluzowych dróg oddechowych poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego, tj. w sposób czysto fizyczny. Po zwilżeniu preparatem tacholiquin roztwór 1% śluz i wydzieliny na błonie śluzowej lepiej się rozpuszczają bez niekorzystnego oddziaływania na warunki fizjologiczne błony śluzowej. Tyloksapol jest niejonowym środkiem zwilżającym, który wytwarza korzystne dla inhalacji spektrum cząstek środka wziewnego. Ponadto środek zwilżający zapewnia, że wdychane krople pozostają dłużej na błonach śluzowych dróg oddechowych. Do stabilizacji spektrum kropeł tacholiquin roztwór 1% zawiera dodatkowo 5% glicerolu.

Pojemnik jednodawkowy preparatu tacholiquin roztwór 1% jest napełniony sterylnie i hermetycznie.

Otwarte fiołki należy zużyć w ciągu jednego dnia.

Opakowanie jednodawkowe po 10 x 5 ml, fiołki po 20 ml

Przechowywać w temperaturze od 2 ° C do 25 ° C! Chronić przed światłem!

S tacholiquin 1% roztwór w pojemniku jednodawkowym przy właściwym przechowywaniu zachowuje trwałość przez 36 miesięcy.

Aktualizacja: październik 2017